

CLÍNICA MÉDICA – QUESTÕES 61 A 72

| | |
|----|--|
| 61 | Punção articular ou artrocentese diagnóstica |
| 62 | Expansão volêmica com soro fisiológico (0,9%) ou com Ringer ou com cristalóide. Insulina não será aceito. |
| 63 | Tiamina ou vitamina B1. Não será aceito apenas vitamina B ou complexo B. |
| 64 | Naloxone |
| 65 | Mycobacterium tuberculosis. Não será aceito tuberculose |
| 66 | Timoma |
| 67 | Alopurinol |
| 68 | Coleta de liquor ou líquido cefalorraquidiano ou punção líquórica |
| 69 | Dexametasona ou corticoide ou corticosteroide |
| 70 | Modificação do estilo de vida ou dieta e atividade física ou promoção da saúde. Introdução de qualquer medicação será considerada errada. |
| 71 | Teste da dieta sem lactose ou restrição de lactose ou dieta sem lactose. |
| 72 | Nitroprussiato de sódio ou labetalol ou nicardipina. Medicação VO não será aceita. |

CIRURGIA- QUESTÕES 73 A 84

| | |
|----|--|
| 73 | Mixoma. Não será aceito tumor intracardíaco |
| 74 | Hidrocele comunicante. Não será aceito apenas hidrocele |
| 75 | 3 horas ou 180 minutos |
| 76 | Angiotomografia de tórax ou tomografia de tórax contrastado. Não será aceita apenas tomografia de tórax. A menção ao contraste é essencial. Sinônimas de exames contrastados de aorta torácica serão considerados. |
| 77 | Artéria poplítea |
| 78 | Perda de tônus simpático. Não será aceito choque neurogênico. A comanda solicita a fisiopatologia do choque, não a classificação. |
| 79 | 60 ml. Será aceita também a dose de 300mg. |
| 80 | Não necessitar de anticoagulação durante a gravidez. |
| 81 | Conexão inadequada do circuito ao frasco coletor ou sistema coletor aberto ou dreno inserido em respiro. |
| 82 | Abdome agudo por perfuração ou abdome agudo perforativo. Somente abdome agudo não será pontuado, assim como diagnósticos etiológicos- úlcera, úlcera perforada, etc. |
| 83 | Excesso de exames de ultrassonografia ou maior rastreio ou maior investigação. |
| 84 | Hemangioma |

PEDIATRIA- QUESTÕES 85 A 96

| | |
|----|--|
| 85 | Coleta de urina por sonda uretral ou sonda vesical ou punção supra-púbica. Não serão consideradas coleta por jato médio ou saco coletor. |
| 86 | 15 dias ou 2 semanas |
| 87 | hiperplasia adrenal congênita forma clássica ou hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal ou insuficiência adrenal. |
| 88 | 3:1 ou 3 compressões para 1 ventilação |
| 89 | Sorologia para hepatite A. Não será aceito hepatite isoladamente. |
| 90 | LH ou hormônio luteinizante |
| 91 | Aspiração de corpo estranho ou obstrução do bronquio de lobo inferior D. Apenas corpo estranho não pontua. |
| 92 | ser realizado em água corrente E imediatamente após o nascimento. Qualquer outra situação de banho ou resposta parcial, serão consideradas incorretas. |
| 93 | Imunoglobulina humana antivaricela zoster (Ighavz). |
| 94 | Episiolistese de cabeça de fêmur ou epifisiólise femoral proximal ou epifisiólise proximal do fêmur. |
| 95 | Menina A |
| 96 | <i>Bordetella pertussis</i> ou <i>Bordetella</i> |

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA- QUESTÕES 97 A 108

| | |
|-----|---|
| 97 | Indicar dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) ou tríplice acelular |
| 98 | Tricomoniase, <i>Trichomonas vaginalis</i> |
| 99 | Reduzir para 20 unidades de insulina NPH (aceitar reduzir para metade ou 1/3 da dose). Retirar insulina ou apenas redução da dose, sem especificação, serão considerados errados. |
| 100 | Repetir mamografia em 2 anos ou controle mamográfico de rotina |
| 101 | Ocitocina ou prescrever ocitocina. (melhor resposta ocitocina IV. Se colocar outra via de administração, será considerada errada). |
| 102 | Fórcipe de Kielland ou fórcipe de rotação |
| 103 | Sulfato de magnésio |
| 104 | Anticoncepcional oral com progestagênio OU implante de progestagênio OU injetável de progestagênio. Qualquer método não hormonal ou que contenha estrogênio será considerado errado. |
| 105 | Parto vaginal ou parto normal ou parto por via baixa. Não serão aceitos apenas parto ou cesárea. |
| 106 | Colposcopia ou encaminhar para colposcopia |
| 107 | Insuficiência ovariana prematura ou insuficiência ovariana precoce ou menopausa prematura. Deve estar informado prematura ou precoce. Sem esta indicação temporal, será considerada errada. |
| 108 | Biópsia de endométrio com Pipelle ou curetagem uterina ou histeroscopia |

SAÚDE COLETIVA- QUESTÕES 109 A 120

| | |
|-----|---|
| 109 | 15/54 ou (x1.000) ou 278 por 1.000 trabalhadores de hortas rurais ou 0,278 ou 0,28 |
| 110 | Intoxicação por organofosforado |
| 111 | PROMOÇÃO DA SAÚDE (ou promoção da saúde no trabalho; ou promoção da saúde do(a) trabalhador(a)) ou ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ou atenção à saúde; ou atenção integral à saúde – e suas variações incluindo “do(a) trabalhador(a)) ou VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (ou vigilância em saúde do(a) trabalhador(a)) |
| 112 | Beveridiano ou de seguridade social |
| 113 | Coorte |
| 114 | Diarreia |
| 115 | Gabarito: fatos ou valores ou deveres ou responsabilidades. |
| 116 | Atropina/atropinização |
| 117 | SINAN ou Sistema informativo de agravos de notificação |
| 118 | Quantificação da atividade da acetilcolinesterase/ colinesterase verdadeira/ colinesterase eritrocitária |
| 119 | Catarata ou conjuntivite ou ceratite |
| 120 | Silica ou sílica livre |