



QUESTÃO 1 (não repetir o enunciado)

- a) Laparotomia exploradora. Válido também videolaparoscopia.

- b) Lesão de bexiga. Válido também lesão de rim.

QUESTÃO 2

- a) Manobra de Kocher: consiste na incisão do peritônio da porção descendente do duodeno e rotação medial dele, até expor a veia cava inferior. Indicada para investigar lesão de duodeno (2ª e 3ª porção), cabeça do pâncreas, veia cava e veias renais.

- b) Manobra de Mattox: consiste na mobilização medial do cólon esquerdo, baço, rim esquerdo e pâncreas para explorar hematoma de retroperitônio, indicada na suspeita de lesão de aorta próxima, tronco celíaco e art. mesentérica superior.

QUESTÃO 3

- a) Transfusão maciça é definida como a transfusão de mais de 10 unidades de concentrado de hemácias nas primeiras 24 horas após a admissão.

- b) Consiste da administração precoce de concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, plaquetas e ácido tranexâmico, com redução na infusão de cristaloides.

QUESTÃO 4

- a) Complicações pulmonares, sendo válido atelectasia ou pneumonia.

- b) Exame radiográfico simples (RX) do tórax. Válido também ultrassom ou tomografia.

QUESTÃO 5

a) Esofagectomia via toracotomia direita, associado à cervicotomia esquerda com esofagostomia terminal e laparotomia com gastrostomia.

b) Fazer a ressecção do esôfago perfurado, lavagem e drenagem do mediastino, ficando a maturação do esôfago cervical e via alimentadora para um segundo tempo cirúrgico, após a reanimação do paciente em unidade de terapia intensiva.