



QUESTÃO 1 (não repetir o enunciado)

a)

Crises mioclônicas e crises tônico-clônicas generalizadas.

Síndrome: Epilepsia generalizada idiopática (Epilepsia genética generalizada), do tipo Epilepsia mioclônica juvenil.

b)

- Trocar a medicação para ácido Valpróico (valproato) até a dose máxima tolerada ou até controle total de crises.

- Acompanhar o meningioma para avaliar eventual indicação cirúrgica se houver crescimento e compressão do parênquima cerebral.

QUESTÃO 2

a)

Encefalite límbica autoimune com crises epiléticas focais e alteração de memória. Ou encefalite límbica viral com crises epiléticas focais e alteração de memória.

b)

Exames:

Eletroencefalograma, Ressonância magnética e pesquisa de autoanticorpos (painel para encefalite límbica autoimune), ou pesquisa de vírus (painel viral, incluindo pesquisa para herpes vírus).

Tratamento:

Medicamentos anticrise.

Considerar tratamento com Imunoglobulina Humana (IGG) EV ou plasmaférese ou pulsoterapia de corticosteróide.

Ou aciclovir, caso tenha evidência para infecção herpética.

QUESTÃO 3

a)

1. Narcolepsia Sintomática (ou Secundária)
2. Dosagem de hipocretina/orexina no LCR.
3. Escore 10 pontos.

b)

1. Distúrbio do Espectro da Neuromielite Óptica (NMO)
2. Dosagem do anticorpo anti-aquaporina 4

QUESTÃO 4

a) Diagnóstico topográfico = Neuronopatia ou ganglionopatia ou poliganglionopatia sensitiva.

Etiologia = síndrome de Sjögren

b) - Eletroneuromiografia

Neuropatia difusa e multifocal (ou não-comprimento dependente) com envolvimento exclusivo de nervos sensitivos (e preservação de nervos motores), padrão axonal

- Ressonância magnética da coluna cervical

Alteração de sinal T2 na região dos funículos posteriores, sem realce pelo meio de contraste

QUESTÃO 5

a)

	Síndrome da pessoa rígida	Síndrome de Isaacs
Auto-anticorpo (+) frequente	Anti-GAD	Anti-VGKC (ou anti-Caspr2)
Topografia de lesão	Medula espinhal (interneurônios inibitórios)	Nervo periférico

b)

- 1) Presença de afterdischarges, neuromiotonia, descargas mioquímicas (ou mioquimia) ou fasciculações agrupadas;
- 2) Baclofeno (oral ou intratecal) e diazepam (ou benzodiazepínico)